

**Composición:** Cada Tableta recubierta contiene:

Paracetamol..... 500 mg

Fenilefrina Clorhidrato..... 5 mg

Clorfenamina Maleato ..... 2 mg

Excipientes c.s.p.....1 Tableta recubierta

**Indicaciones:** Alivio temporal de estos síntomas debido al resfriado común o gripe: congestión nasal, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, dolores y molestias menores, estornudos, fiebre.

**Precauciones y advertencias:** Consultar inmediatamente al médico en el caso de una sobredosis, aunque se sienta bien, debido al riesgo retardado de daño severo hepático. En Adultos no se debe exceder la dosis límite de 4 gr por día. No debe usarse por más de tres días para el tratamiento de fiebre, sin consultar al médico.

No es recomendable su uso por más de 07 días. Puede causar daño hepático y renal.

**Advertencia sobre el hígado:** Este producto contiene Paracetamol. Puede ocurrir daño hepático grave si usted toma: más de 4 000 mg en 24 horas, la cual es la cantidad diaria máxima. Junto con otros medicamentos que contengan Paracetamol. Con 3 o más bebidas alcohólicas al día durante el uso de este producto.

**Alerta de alergia:** El Paracetamol puede causar reacciones cutáneas graves. Los síntomas pueden incluir: Enrojecimiento de la piel, ampollas, erupción cutánea. Si se produce una reacción cutánea, deje de usarlo y busque ayuda médica de inmediato.

**Advertencia sobre dolor de garganta:** Si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días, es acompañado o seguido de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náusea o vómito, consulte a un médico de inmediato.

**No usar este producto:** Con cualquier otro medicamento que contenga Paracetamol (recetado o sin receta). Si usted no está seguro si un medicamento contiene Paracetamol, consulte a un médico o farmacéutico. Si usted está tomando ahora con prescripción, un inhibidor de la mono amino oxidasa (IMAO) (medicación para la depresión, trastornos psiquiátricos o emocionales, o la enfermedad de Parkinson) o por 2 semanas después de suspender el medicamento IMAO. Si usted no sabe si su medicamento recetado contiene un IMAO, pregúntale a un médico o farmacéutico antes de tomar este producto.

**Pregúntele a su médico antes de usar este producto, si usted tiene:** diabetes, enfermedad hepática, enfermedad del corazón, glaucoma, presión sanguínea alta, dificultad para orinar debido al agrandamiento de la próstata, enfermedad de la tiroides, problemas de respiración como enfisema o bronquitis crónica.

**Preguntar a su médico o farmacéutico antes de usar este producto si está tomando:** el anticoagulante Warfarina, Sedantes o tranquilizantes.

**Cuando use este producto: No exceda la dosis recomendada,** Puede ocurrir somnolencia, se debe evitar las bebidas alcohólicas, el alcohol, los sedantes y tranquilizantes pueden aumentar la somnolencia, tener cuidado al conducir un vehículo de motor u operar maquinaria, Puede ocurrir excitabilidad, especialmente en los niños. **Cuando use este producto podrían ocurrir serias reacciones en la piel, pero estas son muy poco comunes. Los síntomas incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel.**

**Evitar el uso y consultar al médico si:** El dolor o congestión nasal empeora o dura más de 7 días, la fiebre empeora o dura más de 3 días, si hay enrojecimiento o hinchazón, si se pone nervioso, mareado e insomne y si ocurre cualquier nuevo síntoma. Estos podrían ser síntomas de afección más grave.

**Si está embarazada o en periodo de lactancia,** consulte a un profesional de la salud antes de usar.

**Advertencia de sobredosis:** En caso de sobredosis, obtenga ayuda médica o contacte al servicio de emergencias inmediatamente. La atención Médica rápida es fundamental tanto para los adultos como para los niños, incluso si no se observan signos o síntomas.

**Advertencia de sobredosis accidental:** Verificar siempre los componentes de los medicamentos que recibe; su desconocimiento podría ocasionar un consumo de Paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (4 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preguntar al médico y/o farmacéutico si se presentan náuseas y vómitos que puedan estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático.

**Dosificación: No tome más de lo indicado (ver la advertencia de sobredosis).** En adultos y niños de 12 años de edad y mayores: tomar 2 tabletas recubiertas cada 6 horas según sea necesario. No tome más de 8 tabletas recubiertas en 24 horas. Niños Menores de 12 años de edad: Consultar a su médico

**Información adicional:**

**Composición de NONGRIPP ANTIGRIPAL MÁXIMA POTENCIA Tablet**

El principio activo es Paracetamol 500 mg, Fenilefrina clorhidrato 5 mg y Clorfenamina 2 mg. Excipientes: polivinilpirrolidona, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, talco, hipromelosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol 6000.

No utilizar **NONGRIPP ANTIGRIPAL MÁXIMA POTENCIA** después de la fecha de caducidad indicada en la caja y el blister. Evitar usar si el empaque está dañado o deteriorado.

Almacenar a una temperatura no mayor de 30 °C, en envase hermético.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA SIN RECETA MÉDICA EN ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS.

**Revisado hasta junio del 2020**