

NONGRIPP ANTIGRIPAL NF

Paracetamol 500 mg + Fenilefrina Clorhidrato 5 mg
Tableta Recubierta

Lea este inserto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora o si la fiebre persiste durante más de 3 días o el dolor durante más de 5 días.
- Si el dolor de garganta es grave, persiste durante más de 2 días, ocurre con o es seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos, consulte a un médico de inmediato.

Contenido del inserto

1. Qué es NONGRIPP ANTIGRIPAL NF y para que se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF
3. Cómo tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es NONGRIPP ANTIGRIPAL NF y para que se utiliza
NONGRIPP ANTIGRIPAL NF, contiene dos principios activos: Paracetamol y Fenilefrina clorhidrato. Está indicado para adultos y niños a partir de 12 años, para el alivio de los síntomas de los resfriados y la gripe, incluidos los dolores de cabeza y los dolores de garganta, congestión nasal, dolores corporales y fiebre.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF

- Si no se siente mejor o empeora después de 5 días, debe consultar a un médico.
- Si es alérgico al Paracetamol, Fenilefrina Clorhidrato o a cualquier otro componente de este medicamento (incluido en la sección 6).
- Si tiene problemas de riñón o hígado, hipertiroidismo, diabetes o si su médico le está haciendo un seguimiento para tratar la hipertensión o las enfermedades cardíacas.
- Si está tomando betabloqueantes para problemas cardíacos o si en las últimas dos semanas ha tomado inhibidores de la monoaminooxidasa recetados para la depresión.
- Menores de 12 años.

Advertencias y precauciones

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF. No tome más de la dosis recomendada (ver sección 3 sobre cómo tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF). Debe buscar atención médica inmediata en caso de sobredosis, incluso si no presenta síntomas. Este medicamento no debe usarse en combinación con otros medicamentos que contengan Paracetamol en su composición. Hable con su médico antes de tomar este medicamento si tiene una enfermedad grave como insuficiencia hepática o renal, incluida la enfermedad hepática alcohólica o si está tomando medicamentos anticoagulantes, como Warfarina, ya que es posible que necesite reducir la dosis.

Otros medicamentos y NONGRIPP ANTIGRIPAL NF

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente, o si toma otros medicamentos. Evite tomar este medicamento junto con otros medicamentos que contengan Paracetamol, descongestionantes, medicamentos para la tos, la gripe y resfriados.

Toma de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF con alimentos, bebidas y alcohol

Tomar regularmente Paracetamol con alcohol (tres o más bebidas alcohólicas por día) puede causar daño hepático. Embarazo y lactancia Si está embarazada o en período de lactancia, si cree que está embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. No tome NONGRIPP ANTIGRIPAL NF si está embarazada o amamantando. Si usted está embarazada, o si sospecha que está embarazada, solo debe usar este medicamento por indicación de su médico. Los alcohólicos crónicos deberán tener precaución de no tomar más de 2 g de Paracetamol. El uso de este producto en dosis superiores a las recomendadas puede estar asociado con un riesgo de insuficiencia hepática grave. Si está tomando otros medicamentos que contienen Paracetamol (el Paracetamol es uno de los principios activos de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF), solo debe utilizarlo por consejo médico.

Niños y adolescentes

Los menores de 12 años no pueden tomar este medicamento. **Interferencias con pruebas analíticas:** Si le van a hacer alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, etc.) comunique a su médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados. **Conducción y uso de máquinas** NONGRIPP ANTIGRIPAL NF puede influir moderadamente en la capacidad para conducir y usar máquinas. Los pacientes afectados por mareos no deben conducir ni utilizar máquinas. **3. Cómo tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF** Tome este medicamento exactamente como se describe en este inserto, o de acuerdo con las instrucciones de su médico o farmacéutico. Hable con su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta. La dosis recomendada es: **Adultos (incluidas las personas de edad avanzada) y niños a partir de 12 años:**

- Tomar 1 o 2 tabletas recubiertas con agua, tres veces al día.
- Si es necesario, el intervalo entre dosis puede ser de 4 o 6 horas, sin embargo, no tomar más de 6 tabletas recubiertas al día.
- No lo tome con menos de 4 horas de diferencia.
- No tome más de 6 tabletas recubiertas en 24 horas.
- No tomar durante más de 3 días, excepto por indicación del médico.

No consuma más de la dosis recomendada. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este medicamento tampoco debe usarse para la automedicación de la fiebre alta (superior a 39 °C), fiebre que dura más de 3 días o fiebre recurrente, a menos que lo prescriba el médico. Para pacientes con insuficiencia renal grave, el intervalo de dosis no debe ser menos de 6 horas. Evite tomar este medicamento junto con otros medicamentos que contengan Paracetamol y descongestionantes, medicamentos para la tos, la gripe y resfriados. Tome NONGRIPP ANTIGRIPAL NF solo si tiene síntomas de gripe o resfriado. Deje de tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF tan pronto como desaparezcan estos síntomas.

Deje de tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF y consulte a su médico:

- Si tiene fiebre durante más de 3 días.
- Si el dolor o la fiebre empeoran.
- Si aparecen otros síntomas.

Uso en población pediátrica:

NONGRIPP ANTIGRIPAL NF no se recomienda para niños menores de 12 años, excepto por indicación médica. La seguridad y eficacia de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF tableta recubierta en niños menores de 12 años no han sido establecidas.

Productos con asociaciones de sustancias activas indicados para resfriados y gripe, compuestos por Fenilefrina no deben usarse en niños menores de 6 años.

Pacientes con problemas de hígado y riñón

Si padece de problemas de hígado y riñón, debe informar a su médico antes de tomar este medicamento.

Si toma más NONGRIPP ANTIGRIPAL NF del que debiera

Consulte a su médico de inmediato, incluso si se siente bien, debido al riesgo de daño hepático que se puede manifestar tardamente. Posibles síntomas de sobredosis de Paracetamol: mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal.

Posibles síntomas de sobredosis de Fenilefrina Clorhidrato: irritabilidad, dolores de cabeza, hipertensión, frecuencia cardíaca anormalmente lenta (bradicardia), mareos y vómitos.

Si está en tratamiento con medicamentos denominados barbitúricos o si padece de enfermedad hepática alcohólica crónica, puede ser más susceptible a la toxicidad hepática de sobredosis por Paracetamol.

Si olvidó tomar NONGRIPP ANTIGRIPAL NF

No tome una dosis doble para compensar las tabletas recubiertas olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con NONGRIPP ANTIGRIPAL NF

No hay ningún efecto por interrumpir o finalizar antes de que haya terminado el tratamiento.

Si aún tiene preguntas sobre el uso de este medicamento, hable con su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, NONGRIPP ANTIGRIPAL NF puede producir efectos adversos, aunque estos no se manifiestan en todas las personas. Las reacciones adversas ocasionalmente notificadas asociadas con los principios activos incluyen: Paracetamol: trombocitopenia, anafilaxia, reacciones de hipersensibilidad cutánea, incluyendo erupción cutánea, angioedema y síndrome de Stevens-Johnson, broncoespasmo en pacientes sensibles a la Aspirina y otros AINE, disfunción hepática y nefritis intersticial después del uso prolongado de altas dosis de Paracetamol.

Fenilefrina Clorhidrato: nerviosismo, dolores de cabeza, mareos, insomnio, agrandamiento, presión arterial, náuseas y vómitos.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este inserto. Se pide a los profesionales sanitarios y a los pacientes usuarios reportar cualquier sospecha de reacción adversa al correo electrónico farmacovigilancia@minsa.gob.pe. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Este producto deberá conservarse a una temperatura no mayor de 30 °C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de la abreviatura F.V. No utilice este medicamento si observa que el envase inmediato o la caja presenta manchas, decoloración, daño, rotura o algún otro indicio visible de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF Tableta recubierta

Los principios activos son Paracetamol y Fenilefrina clorhidrato. Cada tableta recubierta contiene 500 mg de Paracetamol y 5 mg de Fenilefrina clorhidrato.

Los otros componentes son: povidona, dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, colorante amarillo Iaca N° 10 (CI 47005), estearato de magnesio, celulosa microcristalina, hipromelosa, propilenglicol, polietilenglicol 6000, dióxido de titanio (CI 77891), talco, alcohol etílico y agua purificada (estos dos últimos se eliminan durante el proceso de elaboración).

Aspecto de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF y contenido del envase

Las tabletas recubiertas de NONGRIPP ANTIGRIPAL NF son oblongos de color amarillo recubiertos con película. Las tabletas recubiertas se envasan en blíster de PVC incoloro/Aluminio y a su vez en cajas de cartón conteniendo las presentaciones autorizadas.

VENTA SIN RECETA MÉDICA EN ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

Fabricado por:

Laboratorios PHARMED CORPORATION S.A.C.

Para:

Droguería E.S.C. PHARMED CORPORATION S.A.C.

Pharmed
Corporation E.S.C.