

Orfenadrina Citrato 100 mg
Tableta de Liberación Prolongada

COMPOSICIÓN

Cada Tableta de liberación prolongada contiene:
Orfenadrina Citrato..... 100 mg
Excipiente c.s.p. 1 tableta de liberación prolongada

INDICACIONES

Orfenadrina citrato 100 mg, tableta de liberación prolongada se utiliza para ayudar a relajarse ciertos músculos de su cuerpo y para aliviar el dolor y la incomodidad causado por espasmos, distensiones u otras lesiones en los músculos.

Su médico puede haberle recetado Orfenadrina Citrato 100 mg para otro propósito.

Pregúntele a su médico si tiene algunas preguntas sobre por qué le ha recetado este medicamento.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Orfenadrina citrato es un relajante del músculo esquelético. Actúa en el sistema nervioso central para producir sus efectos relajantes musculares.

CONTRAINDICACIONES

No tome Orfenadrina citrato si:

- Ha tenido una reacción alérgica a la Orfenadrina citrato u otros medicamentos similares, o a cualquiera de los ingredientes incluidos en la formulación del medicamento.
- Tiene alguno de los siguientes síntomas:
 - Glaucoma (presión alta en el ojo);
 - Obstrucción intestinal, estómago, úlcera o enfermedad esofágica;
 - Agrandamiento de la próstata u obstrucción de la vejiga;
 - Miastenia gravis (una enfermedad de los músculos que causa párpados caídos, visión doble, dificultad para hablar y tragar, y a veces debilidad muscular en los brazos o piernas).
- Después de la fecha de caducidad indicado en el empaque.
- Si el empaque muestra signos de manipulación.

No administrar este medicamento a un niño menor de 12 años. La seguridad y eficacia en niños menores de 12 años no han sido establecidas.

ADVERTENCIAS

Informe a su médico o farmacéutico si:

- Tiene alergia a cualquier otro medicamento, alimentos, conservantes o tintes.
- Tiene algún problema de corazón.
- Tiene algún problema a nivel del hígado o riñón.

Informe a su médico si está embarazada o tiene la intención de quedar embarazada o en periodo de lactancia o planea dar de lactar.

Su médico o farmacéutico puede discutir los riesgos y beneficios involucrados.

Si no está seguro de comenzar a tomar este medicamento, hable con su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico o farmacéutico si estas tomando cualquier otro medicamento, incluidos los que usted compra sin receta en su farmacia, supermercado o tienda de comida saludable.

Algunos medicamentos pueden verse afectados por Orfenadrina citrato. Estos incluyen:

- Anticolinérgicos (medicamentos utilizados para aliviar los calambres de estómago o espasmos),
- Medicamentos utilizados para tratar la depresión,
- Dextropropoxifeno
- Otros medicamentos depresores del sistema nervioso central, incluidos alcohol. Ejemplos de depresores del SNC son los antihistamínicos o medicamentos para la fiebre del heno, otras alergias o resfriados; sedantes o tranquilizantes; analgésicos narcóticos; barbitúricos; medicamentos para convulsiones anestésicos, incluidos algunos anestésicos dentales y otros relajantes musculares.

Es posible que necesite diferentes cantidades de sus medicamentos, o puede que necesite tomar diferentes medicamentos. Su médico o farmacéutico tienen más información sobre medicamentos con los que haya que tener cuidado o evitar tomar mientras usa Orfenadrina citrato.

PRECAUCIONES

Informe a todos los médicos, dentistas y farmacéuticos que le están tratando, que está tomando Orfenadrina citrato.

Si queda embarazada mientras está tomando este medicamento dígame a su médico de inmediato.

Tenga cuidado al conducir u operar maquinaria hasta que sepa cómo la medicina le afecta.

Orfenadrina citrato puede causar que algunas personas tengan visión borrosa o volverse somnolientas, mareadas, aturdidas, débiles o menos alerta de lo que están normalmente. Eso también puede causar debilidad muscular en algunas personas. Si tiene alguno de estos síntomas no conduzca ni opere maquinaria o haga cualquier cosa de lo contrario, podría ser peligroso.

Orfenadrina citrato puede causar sequedad de la boca. Para un temporal alivio puede usar goma de mascar o dulces sin azúcar, derrita un poco hielo en la boca o use sustituyente de saliva.

Si continúa con la boca seca por más de 2 semanas hable con su dentista.

La sequedad continua de la boca puede aumentar la posibilidad de enfermedades dentales, incluyendo caries, enfermedad de las encías e infecciones por hongos.

Orfenadrina citrato es un medicamento bajo prescripción médica y solo puede ser recetado para usted solamente.

Este medicamento contiene lactosa.

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Siga a cabalidad todas las instrucciones que le puedan brindar su médico o farmacéutico.

Ellos pueden diferir de la información contenida en este inserto.

Si no comprende las instrucciones en este inserto pregunte a su médico o farmacéutico en busca de ayuda.

Dosificación

La dosis habitual de Orfenadrina Citrato 100 mg en adultos es una tableta dos veces al día. Su médico le recetará la dosis correcta para usted.

Tome Orfenadrina Citrato 100 mg solo como se lo ha indicado su médico o farmacéutico. No cambie la dosis a menos que su médico le indique hacerlo.

Si olvidas tomar este medicamento

Si olvida una dosis de este medicamento y la recuerda dentro de una hora más o menos de la dosis perdida, tómela tan pronto sea posible. Si no se acuerdas hasta más tarde, omite la dosis olvidada y continúe con la próxima dosis como lo haría normalmente. No duplique las dosis.

Si toma demasiadas dosis (sobredosis)

No tome más de la dosis recomendada a menos que su doctor le indique que lo haga. Si usted o alguien más ha tomado demasiado Orfenadrina Citrato 100 mg póngase en contacto con su médico o farmacéutico, o con el Centro Asistencial de Salud más cercano. Es posible que necesite atención médica urgente. Los síntomas de una sobredosis incluyen emoción; confusión; confusión severa que conduce al coma; convulsiones; frecuencia cardíaca acelerada, pupilas dilatadas y dificultad para orinar.

REACCIONES ADVERSAS

Todos los medicamentos pueden causar reacciones adversas. A veces son graves, la mayoría de las veces no lo son.

Hable con su médico si ocurre alguno de las siguientes reacciones adversas:

Menos comunes:

Micción disminuida, dolor ocular; desmayo; latidos rápidos o fuertes.

Raros:

Alucinaciones; falta de respiración; dificultad para respirar; opresión en el pecho y/o sibilancias; erupción cutánea; llagas, úlceras o manchas blancas en los labios o en boca; glándulas hinchadas y/o adoloridas, hematomas o sangrado inusuales; cansancio o debilidad inusuales.

Las siguientes reacciones adversas suelen suceder y no necesitan de atención médica y pueden desaparecer durante el tratamiento, de acuerdo a como su organismo se vaya adaptando al medicamento.

Hable con su médico si alguno de las siguientes reacciones adversas continúa o son molestos:

Más común:

Sequedad de la boca.

Menos comunes o raros:

Calambres abdominales o estomacales o dolor; visión borrosa o doble; confusión; estreñimiento; dificultad en orinar; mareos o aturdimiento; somnolencia; emoción, irritabilidad, nerviosismo o inquietud; dolor de cabeza; debilidad muscular, pupilas de los ojos inusualmente dilatadas.

Otras reacciones adversas no enumeradas anteriormente también pueden ocurrir en algunos pacientes.

Si nota algún efecto secundario que no están incluidos en este inserto, informe a su médico o farmacéutico.

INCOMPATIBILIDADES

No se han reportado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Orfenadrina citrato 100 mg, tabletas de liberación prolongada

El principio activo es Orfenadrina Citrato 100 mg

Excipientes: Polímero del ácido metacrílico (Eudragit RS PO), lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, estearato de magnesio.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No utilice Orfenadrina citrato 100 mg, tableta de liberación prolongada después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. Evitar usar si el empaque está dañado o deteriorado.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Almacenar a una temperatura no mayor de 30 °C.

VENTA CON RECETA MÉDICA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FABRICADO POR:
LABORATORIO PHARMED CORPORATION S.A.C.

