

UREN
Fenazopiridina clorhidrato 100 mg
Tabletas recubiertas

Analgesico del tracto urinario

FÓRMULA

Cada tableta recubierta contiene:

Fenazopiridina clorhidrato..... 100 mg

Excipientes c.s.p..... 1 Tableta recubierta

INDICACIONES

UREN tabletas recubiertas está indicado para uno o más de las siguientes condiciones médicas:

- Dolor, ardor, frecuente urgencia, y otras molestias resultantes del tracto urinario inferior causado por infección, trauma, cirugía, procedimientos endoscópicos, o el paso de sondas o catéteres.

UREN tabletas recubiertas está indicado para uso a corto plazo y puede aliviar solamente los síntomas; no es un tratamiento subyacente para la causa de los síntomas.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

La Fenazopiridina se excreta en la orina, donde ejerce un efecto analgésico tópico en la mucosa del tracto urinario inferior. Esta acción ayuda a aliviar el dolor, ardor, frecuente urgencia. El mecanismo preciso de la acción es desconocido.

CONTRAINDICACIONES

No tome Fenazopiridina clorhidrato si tiene alguno de las siguientes condiciones médicas:

- Hipersensibles al fármaco o a cualquier componente de su formulación
- Insuficiencia renal
- Enfermedad hepática severa.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Si su piel o el blanco de sus ojos desarrollan un tono amarillento, puede indicar que sus riñones no están eliminando la medicación como deberían. **DETENER LA TOMA DEL MEDICAMENTO Y NOTIFICAR A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.**

Si tiene, o ha tenido anteriormente, alguna de las siguientes condiciones médicas consulte con su médico para discutir otras opciones de tratamiento distintas a Fenazopiridina clorhidrato.

- Hipersensibles al fármaco o a cualquier componente de su formulación
- Insuficiencia renal
- Enfermedad hepática severa.

Fenazopiridina produce una coloración anaranjada a rojo en la orina y las heces y puede causar manchas. Se ha reportado tinción en los lentes de contacto. Si usted es anciano, su médico deberá vigilarlo más minuciosamente, ya que los riñones funcionan menos eficazmente a su edad.

Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Deficiencia G-6-PD
- Insuficiencia renal
- Enfermedad hepática severa.
- Cualquier otro problema médico

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Hable con su médico y farmacéutico si usted está tomando alguna otra medicación (con receta o sin receta) como cualquiera de los siguientes (No es una lista completa)

- Ciprofloxacino

No se han reportado otras interacciones.

REACCIONES ADVERSAS

Efectos secundarios serios, con qué frecuencia dejarlos pasar y qué hacer al respecto.		
Sintoma	Dejar de tomar y hablar a su médico o farmacéutico.	Deja de tomar y obtener atención médica de emergencia INMEDIATAMENTE
Dolores de cabeza, rigidez en el cuello.		✓
Falta de aliento, sibilancias, cualquier problema respiratorio u opresión en el pecho		✓
Erupción cutánea, urticaria, hinchazón del cuello, garganta, lengua o comezón		✓
Visión borrosa, o cualquier alteración visual	✓	
Náuseas, vómitos y Diarrea.	✓	
Decoloración amarilla de la piel o el blanco de los ojos con o sin picazón en la piel	✓	

Fenazopiridina clorhidrato puede causar algunos efectos secundarios, especialmente cuando se utiliza durante mucho tiempo o en grandes dosis. Cuando estos efectos secundarios ocurren, puede requerir atención médica. Informe de todos los síntomas o efectos secundarios a su médico.

Fenazopiridina clorhidrato puede convertir su piel o el blanco de sus ojos a un tono amarillento. Si tienes cualquiera de esos síntomas contacte a su médico inmediatamente.

Consulte con su médico INMEDIATAMENTE si desarrolla escalofríos, fiebre, dolores musculares o dolores u otros síntomas similares a la gripe, hinchazón del cuello y garganta y la lengua, especialmente si se presentan antes o juntas con una erupción en la piel. Estos síntomas pueden ser los primeros signos de una REACCIÓN ALERGICA SEVERA a esta medicación.

Esta NO es una lista completa de efectos secundarios. Si usted desarrolla cualquier otro síntoma mientras esté tomando Fenazopiridina clorhidrato, consulte a su médico. Estos efectos secundarios son raros.

DOSES Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Adultos

Dosis habitual: 200 mg 3 veces al día después de las comidas.

Tome Fenazopiridina clorhidrato solo como se lo indique su médico.

NO lo tome por un período más largo del que su médico le haya recomendado. Si es posible, debe tomar la dosis más baja de este medicamento durante el menor tiempo posible.

Tomar demasiado Fenazopiridina clorhidrato puede aumentar sus posibilidades de efectos no deseados y a veces, efectos secundarios riesgosos, especialmente si usted es anciano y tienen otras enfermedades.

Si va a utilizar Fenazopiridina clorhidrato durante más de 2 días, consulte a su médico regularmente para discutir si este medicamento está funcionando para usted o si está causándole algún efecto no deseado.

Este medicamento ha sido recetado específicamente para ti. NO se lo dé a nadie más. Puede dañarlos, incluso si sus síntomas parecen ser similares a tuyo. Fenazopiridina clorhidrato NO se recomienda para uso en pacientes menores de 18 años debido a que la seguridad y la efectividad NO ha sido establecida.

Siga todas las instrucciones dadas por su médico o farmacéutico con cuidado. Pueden diferir de la Información contenida en este folleto. Si no logra entender las instrucciones en el envase pídale ayuda a su médico o farmacéutico.

Tome Fenazopiridina clorhidrato exactamente como su médico se lo ha prescrito.

Fenazopiridina clorhidrato debe tomarse después de las comidas.

Pérdida de una Dosis

Si se olvida una dosis, debe tomarla tan pronto como recuerde. Si está cerca de la hora de la siguiente dosis, omita la dosis olvidada y reanudar su dosificación habitual.

No duplicar la dosis para ponerse al día.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS

Si toma más de la dosis prescrita, contacte a su médico de inmediato.

Exceder la dosis recomendada en pacientes con función renal normal o administrar la dosis recomendada a pacientes con función renal reducida (común en pacientes ancianos) puede llevar a un aumento de los niveles séricos y reacciones tóxicas. La metahemoglobinemia generalmente sucede después de una sobredosis masiva y aguda.

Tratamiento: El tratamiento es sintomático y de soporte. El azul de metileno, 1 a 2 mg / kg / dosis administrada i.v. como solución al 1%, según sea necesario, debe causar una reducción rápida de la metahemoglobinemia y la desaparición de la cianosis, lo cual es una ayuda para el diagnóstico.

INCOMPATIBILIDADES

No se han reportado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de UREN Tabletás recubiertas

El principio activo es Fenazopiridina clorhidrato 100 mg.

Excipientes: celulosa microcristalina, Lactosa monohidrato, Povidona, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, polietilenglicol, talco, dióxido de titanio (CI 77891), colorante Laca rojo N° 40 (CI 16035).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

No utilizar UREN Tabletás recubiertas después de la fecha de caducidad indicada en la caja y el blíster. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. Evitar usar si el empaque está dañado o deteriorado.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Almacenar a una temperatura no mayor de 30 °C, en envase hermético.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VENTA CON RECETA MÉDICA

FABRICADO POR:

Laboratorios PHARMED CORPORATION S.A.C.

